



RAWC

RAYFORD ANIMAL WELLNESS CLINIC

INSTRUCCIONES POST QUIRÚRGICAS

LAS PRIMERAS 24 HORAS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

- Restringir la ingesta de comida de una mascota adulta para evitar malestar estomacal por la anestesia. *Puede ofrecer alimentos en cantidades muy pequeñas durante las primeras 12 horas después de retirar a su mascota de la cirugía.

(No se preocupe si su mascota no quiere comer de inmediato)

- Retire los alimentos hasta la mañana si ocurre el vómito.

- Puede ofrecer continuamente pequeñas cantidades de agua si la mascota está interesada.

- A los gatitos se les puede ofrecer la cantidad normal de comida y agua al regresar a casa.

- Mantenga a la mascota en un área confinada lejos de otras mascotas y niños por un mínimo de tres días.

- Para permitir una curación apropiada, e independientemente del nivel de actividad de la mascota. Se recomienda que restrinja las acciones de su mascota por hasta 14 días.

- Descansar y dormir son esenciales para la curación.

****No le dé ASPIRIN, ADVIL, o TYLENOL a su mascota para el dolor. Estos medicamentos pueden ser fatalmente tóxicos**

- Si le han recetado medicamentos para el dolor, siga las instrucciones escritas cuidadosamente.

- Debe evitar que su mascota lama la incisión o el pegamento quirúrgico.

****Si su mascota no puede ser reprimida de lamer, le recomendamos un Elizabethan-collar (E-collar), que se ajusta alrededor del cuello y evita lamer. Puede comprar a través de RAWC o en cualquier tienda de mascotas, PetSmart y Petco.**

PARA LA PRÓXIMA SEMANA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA:

*Camine a su perro solo con una correa. No correr, saltar o jugar bruscamente durante 14 días.

*Monitor de incisión, una pequeña cantidad de enrojecimiento e hinchazón es normal. Si nota alguna descarga o enrojecimiento excesivo, notifique a la clínica lo antes posible.

*Si su mascota lleva puesto un e-collar, no lo saque durante 5-7 días, a menos que la mascota esté siendo monitoreada.

*NO LIMPIE LA INCISIÓN.

*NO BAÑE, PONGA SU MASCOTA MOJADA DURANTE 7 DÍAS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA.

*NO APLIQUE UN ACEITE TÓPICO A LA INCISIÓN.

*NO PERMITA QUE FUNCIONE, SALTANDO ANTES DE JUEGOS DURANTE 14 DÍAS.

****Si su mascota hembra estaba en celo en el momento de la cirugía, restrinja el acceso a los machos inalterados durante al menos 14 días.****

Posible complicación: La esterilización y la castración son cirugías muy comunes. Sin embargo, pueden ocurrir complicaciones. El enrojecimiento y la hinchazón mínimos deben resolverse dentro de varios días.

-Si persiste por más tiempo, contáctese con el personal veterinario inmediatamente. Si notas alguna de estas cosas:

- Gomas pálidas
- Depresión
- Vomitando
- Diarrea
- Descarga o sangrado de la incisión
- Dificultad para orinar
- Sin apetito
- Dificultad para respirar

CLÍNICAS DE EMERGENCIA DESPUÉS DE HORARIOS:

Blue Pearl Veterinary Specialists- 1646 Spring Cypress Rd #100, Spring, TX 77388 - (832) 616-5000

Animal Emergency Urgent Care- 27870 Interstate 45 Service Road, The Woodlands, TX 77385 - (281) 367-5444